

WIOLETTA MĘDRZYCKA-DĄBROWSKA<sup>1,2</sup>, DOROTA PILCH<sup>1,3</sup>, ANETA KUBISA<sup>1,4</sup>

## ZALECENIE GRUPY ROBOCZEJ DO SPRAW PRAKTYKI PTPAiIO W SPRAWIE WYTYCZNYCH PIELĘGNOWANIA JAMY USTNEJ I NOSOWEJ U DZIECI W ODDZIALE INTENSYWNEJ TERAPII

PRACTICAL GUIDELINES OF THE CLINICAL PRACTICE TASK FORCE OF PTPAiIO ON OROPHARYNGEAL HYGIENE IN PEDIATRIC INTENSIVE CARE

**STRESZCZENIE:** Pielęgnacja jamy ustnej u dzieci leczonych w oddziałach intensywnej terapii pediatrycznej (OITP) jest ważnym elementem zapobiegania powikłaniom związanym z zakażeniami szpitalnymi oraz prowadzeniem wentylacji mechanicznej. Dobór techniki oraz preparatów zależy od wieku dziecka oraz jego stanu klinicznego. Płytką nazębną obecna zarówno na zębach mlecznych, jak i stałych stanowi źródło patogenów. W efekcie dochodzi do kolonizacji jamy ustnej i gardła oraz wzrostu ryzyka rozwoju zapalenia płuc związanego z wentylacją mechaniczną (ang. ventilator-associated pneumonia – VAP).

**SŁOWA KLUCZOWE:** oddział intensywnej terapii pediatrycznej, pielęgnowanie, toaleta jamy ustnej, VAP

**ABSTRACT:** Mouth hygiene in pediatric intensive care is an important issue in terms of care and prevention of hospital-acquired infections, including infections related to mechanical ventilation. Its technique and the choice of the product should be adjusted to child's age and clinical status. Superficial plaque of both deciduous and permanent teeth is a source of pathogens, resulting in oropharyngeal colonization and increased risk of ventilator-associated pneumonia (VAP).

**KEY WORDS:** care, mouth hygiene, pediatric intensive care, ventilator-associated pneumonia

- 1 Grupa Robocza ds. Praktyki Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki
- 2 Zakład Pielęgniarstwa Ogólnego Katedry Pielęgniarstwa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
- 3 Universitäts Klinikum Eppendorf, Hamburg
- 4 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Noworodków i Dzieci Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im J. Gromkowskiego we Wrocławiu

✉ **WIOLETTA MĘDRZYCKA-DĄBROWSKA**  
Zakład Pielęgniarstwa Ogólnego,  
Katedra Pielęgniarstwa,  
Gdański Uniwersytet Medyczny,  
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,  
80-210 Gdańsk,  
Tel.: 58 349 19 84,  
e-mail: wioletta.medrzycka@gumed.edu.pl

Wpłynęło: 22.04.2017

Zaakceptowano: 16.05.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/PwAilO2017019

### WSTĘP

Zawiązki zębów powstają na etapie życia wewnątrzmacicznego, zęby mleczne wyrastają około 6. miesiąca życia, a stałe uzębienie między 6. a 12. rokiem życia. Procesy te kończą się między 17. a 25. rokiem życia. Płytką nazębną zarówno zębów mlecznych, jak i stałych stanowi źródło patogenów [1]. Efektem jej obecności może być kolonizacja okolicy gardła i krtani oraz wyższe ryzyko wystąpienia zapalenia płuc związanego z wentylacją mechaniczną (ang. ventilator-associated pneumonia – VAP) [2]. VAP stanowi drugą co do częstości występowania infekcję na oddziałach intensywnej terapii pediatrycznej (OITP) i wpływa na wzrost śmiertelności pacjentów tych oddziałów [3]. W OITP na alokację flory bakteryjnej do płuc najbardziej narażone są

osoby zaintubowane, szczególnie z wykorzystaniem rurki intubacyjnej bez mankieta uszczelniającego. Ponieważ u chorych zaintubowanych, wentylowanych respiratorem brak jest fizjologicznego oczyszczania jamy ustnej, ryzyko wysychania śluzówek i ich uszkodzenia wzrasta. Podobny problem związany z niekorzystnym działaniem tlenu na śluzówki jamy ustnej występuje u osób poddawanych tlenoterapii biernej bądź wentylacji nieinwazyjnej.

Proces ten pogłębia przyjmowanie niektórych leków zmniejszających wydzielanie śliny. Niebagatelny wpływ na ryzyko wystąpienia VAP u pacjentów pediatrycznych ma stan uzębienia. Występowanie próchnicy u dzieci w wieku przedszkolnym sięga 40%, a wartość ta stale rośnie. Proces ten koreluje ze spożywaniem produktów o wysokiej zawartości cukru, niskim statusem socjoekonomicznym oraz

niskim poziomem edukacji. Próchnica należy do powszechnie spotykanych chorób przewlekłych wywołanych przez specyficzną florę bakteryjną – mutans *Streptococcus* (MS) – prowadzących do demineralizacji struktur zębowych. Dzieci, w tym noworodki i niemowlęta, mogą zostać skolonizowane MS w wyniku bezpośredniego kontaktu śliny matki/rodzica z akcesoriami używanymi przez dziecko (łyżeczki, smoczki, butelki). Dlatego istotne jest objęcie opieką i leczeniem kobiet w ciąży [4]. Stover podaje, że częstość występowania VAP u noworodków wynosi 6,8–32,2%. Zgodnie z danymi NNIS (ang. National Nosocomial Infections Surveillance) w 2004 roku w grupie noworodków z masą urodzeniową poniżej 1000 g zapalenie płuc związane ze stosowaniem wentylacji mechanicznej zaobserwowano u 2,4–8,5 osób/1000 dni wentylacji (Me – 3,5) [3, 5]. Natomiast według Zweta, Yuana, Hentschela, Cordero i wsp. częstość ta wynosi 12–52/100 dni wentylacji [6–9].

Na wysoki wskaźnik VAP wpływa niski poziom odporności dzieci związany z wcześniactwem, stanowiący ryzyko wystąpienia zapalenia płuc. Negatywny wpływ na dzieci z masą ciała poniżej 2000 g ma również prowadzenie wentylacji mechanicznej oraz infekcje (w tym zakażenia związane z obecnością cewnika). Niekorzystne oddziaływanie ma również: prowadzenie sedacji, odsysanie z tchawicy oraz ponowne intubowanie tchawicy. Rzadziej VAP występuje u dzieci wspomaganych dodatnim ciśnieniem w sposób nieinwazyjny, np. przez jamę nosową – od 12,5/1000 dni wentylacji inwazyjnej do 1,9/1000 wentylacji wspomagającej nieinwazyjnej typu nCPAP (ang. continuous positive airway pressure);  $p=0,04$  [6–8, 10]. Zbyt mała ilość personelu pielęgniarskiego zatrudnionego w OITP, sprawującego opiekę nad pacjentami wentylowanymi, znacząco wpływa na częstość występowania VAP. Innym czynnikiem jest brak mankietu uszczelniającego, także związany z większym ryzykiem aspiracji [3].

Proces zapalny zapoczątkowują bakterie Gram-dodatnie bytujące w jamie ustnej już po 48 godzinach wentylacji mechanicznej, a następnie bakterie Gram-ujemne kolonizujące rurkę intubacyjną. Uniesienie wezłowania łóżeczka minimalizuje ryzyko aspiracji. Zaobserwowano, że kolonizacja rurki po 5–6 dniach była mniejsza w przypadku układania dzieci w pozycjach bocznych, niż na plecach (od 30 do 87%;  $p<0,01$ ). Analizowano również wpływ flory bakteryjnej żołądka na występowanie VAP. Nie znaleziono badań oceniających związek między zapaleniem płuc związanym z wentylacją mechaniczną a blokerami H<sub>2</sub> u noworodków [6–9]. Do innych czynników sprzyjających rozwojowi stanów zapalnych jamy ustnej u dzieci należą zakażenia grzybicze przewodu pokarmowego, zwłaszcza grzybami z grupy *Candida*. Szczególne zagrożenie w grupie noworodków z niską masą urodzeniową stanowi inwazyjne zakażenie grzybicze (IZG). Czynnikiem wpływającym na rozwój IZG są: niedojrzałość poniżej 28. tygodnia życia płodowego, żywienie

pozajelitowe, hiperglikemia, martwicze zapalenie jelit oraz długotrwała hospitalizacja [11].

Toaleta jamy ustnej stanowi integralną część kompleksowej pielęgnacji ciała oraz jest wyrazem zaspokajania potrzeb higienicznych człowieka chorego, w tym dziecka. Wykonanie toalety jamy ustnej wpływa na poprawę samopoczucia pacjenta, a ponadto stanowi element edukacyjny w ramach współpracy z rodziną [12]. Ustalono związek między niewłaściwą toaletą jamy ustnej a gromadzeniem się płytki nazębnej, kolonizacją gardła oraz wyższymi wskaźnikami zachorowalności na szpitalne zapalenie płuc (ang. hospital-acquired pneumonia – HAP), w tym także VAP [12–14].

Ślina stanowi ważną barierę obronną w górnej części układu pokarmowego, chroniąc również wejście do dróg oddechowych, ponieważ zawiera liczne enzymy, takie jak: laktoferyna, lizozym, laktoperoksydaza, immunoglobuliny regulujące ilość i skład flory bakteryjnej. Obecność fibronektyny wiąże bakterie Gram-ujemne na komórkach epitelialnych (nabłonkowych) [2]. Ślina wraz z zawartymi w niej związkami tworzy na zębach warstwę ochronną dla struktury zębów, reguluje pH i nawilża jamę ustną [3].

Naturalne mechanizmy obronne ulegają zaburzeniom pod wpływem leczenia pacjenta czy występowania chorób współistniejących. Dodatkowo chorzy pediatryczni dość często obciążeni są próchnicą zębów mlecznych [2, 6].

W przebiegu choroby lub leczenia upośledzone zostają mechanizmy regulujące wytwarzanie i połykanie śliny oraz poruszanie językiem, związane m.in. z: intubacją dotchawiczą, respiratoroterapią, stosowanymi lekami przeciwbólowymi, sedatywnymi, diuretykami, a także antybiotykami. W konsekwencji może dojść do rozwoju suchości w jamie ustnej, predysponującej do rozwoju zapalenia dziąseł, błony śluzowej jamy ustnej czy miejscowej kolonizacji, co w konsekwencji przyczynia się do rozwoju infekcji o charakterze uogólnionym [2, 3].

Pacjent, który ze względu na ciężki stan chorobowy lub z powodu stosowanej wobec niego sedacji ma ograniczoną aktywność własną, narażony jest również na wyższe ryzyko rozwoju powikłań oddechowych niż osoba przytomna i aktywna. Sedacja i relaksacja mięśni powodują, że chory ma zniesione mechanizmy obronne, takie jak odruch kaszlowy. Jak dowiedziono w badaniach porównawczych, pacjenci posiadający uzębienie oraz dzieci z uzębieniem mlecznym-próchnicznym, znajdują się w gorszej sytuacji niż pacjenci bezzębni [3, 12]. Bakterie, które wywołują szpitalne choroby dróg oddechowych, kolonizują okolice części ustnej gardła, w tym także płytkę nazębną [1, 4, 6, 15].

Ryzyko wystąpienia szpitalnego zapalenia płuc obserwuje się również u pacjentów nieobjętych wentylacją mechaniczną, cierpiących na dysfagię, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc lub nowotwór złośliwy oraz u osób po udarze [1, 16, 17].

W grupie pacjentów, u których prowadzona jest wentylacja mechaniczna i intubacja dotchawicza, częstość występowania zakażeń jest 21-krotnie większa w porównaniu z chorymi niewentylowanymi. Nieprzygotowana do intubacji jama ustna podwyższa ryzyko wystąpienia aspiracji i infekcji [6]. Ilość zakażeń i powikłań wzrasta proporcjonalnie do czasu wentylacji [7]. Im dłużej stosowany jest oddech zastępczy, tym większa częstość VAP [4, 15–18].

W przypadku nieprawidłowego uszczelnienia maski rurki intubacyjnej ślina z jamy ustnej pacjenta może znaleźć się w okolicy podgłośniowej. Ciśnienie w maskownicy uszczelniającej rurkę intubacyjną powinno być regularnie mierzone i wynosić 20–30 mmHg. W przypadku refluksu żołądkowego lub obecności wydzieliny związanej z zapaleniem zatok również te treści o charakterze patogennym mogą dostać się do dolnych dróg oddechowych. Istnieje możliwość zastosowania specjalnych rurek intubacyjnych z możliwością odsysania okolicy podgłośniowej, co przynosi pozytywne efekty terapeutyczne, ale jest kosztowne, dlatego m.in. zaleca się ich stosowanie u osób, które będą wentylowane dłużej niż 72 godziny [2, 7]. Zamknięte systemy do odsysania pozwalają także na uniknięcie zakażeń egzogennych, w tym krzyżowych [4, 6, 16].

Zaburzenie mechanizmów fizjologicznych i funkcji nosa, podobnie jak w przypadku jamy ustnej, stanowi problem u pacjentów wentylowanych mechanicznie. Konieczność założenia zgłębnika żołądkowego stwarza możliwość wprowadzenia bakterii w niższe obszary układu oddechowego, ponieważ zgłębnik stanowi pomost dla bakterii zarówno z nosa, jak i żołądka. W ciągu 24 godzin na zgłębniku powstaje biofilm bakteryjny zwiększający ryzyko translokacji bakterii jelitowych do układu oddechowego. Obecność zgłębnika w przewodzie nosowym zwiększa ponadto ryzyko wystąpienia powikłań, takich jak: zapalenie śluzówki nosa, mikrouszkodzenia czy obrzęki. Niekorzystne dla pacjenta jest także wysychanie śluzówek przy podaży tlenu o dużym przepływie [6, 12]. Przed wprowadzaniem zgłębnika żołądkowego konieczne jest umycie nosa i zdezynfekowanie obydwu nozdrzy. Do wprowadzania zgłębnika należy stosować środki poślizgowe, np. roztwór poliheksanidu. Zdrowe tkanki jamy nosowej można pielęgnować roztworem 0,9% NaCl, maścią Bepanthen® i roztworem panthenolu. Należy regularnie zmieniać położenie zgłębnika, a do mocowania używać hypoalergicznego plastra mocującego. W wielu badaniach dowiedziono zależności pomiędzy dekontaminacją jamy ustnej i nosowej a zmniejszeniem ryzyka rozwoju VAP. Udowodniono, że jama ustna stanowi źródło zachorowań na HAP, włączając w to VAP (Tabela 1) [1, 2, 6, 7, 13, 16].

Zapobieganie nieprawidłowemu oddychaniu dziecka przez usta jest istotne w perspektywie jego rozwoju. Interwencje dotyczą korygowania ułożenia głowy, domykania bródki z jednoczesnym jej podparciem np. pieluszką. U niektórych pacjentów może występować nadwrażliwość oralna,

objawiająca się wygórowanymi i nieproporcjonalnymi reakcjami w odniesieniu do siły bodźca, np. podczas odsysania, wynikająca z wcześniactwa, ograniczonej lub przerwanej stymulacji układu przedsionkowego w życiu płodowym [19]. Interwencje związane z udrażnianiem dróg oddechowych – takie jak odsysanie wydzieliny, zakładanie zgłębnika żołądkowego i jego obecność – zaburzają u dziecka wzorzec ssania, są stresujące i nierzadko bolesne. Wpływa to negatywnie na umiejętność ssania i koordynację z oddychaniem. Stosowanie smoczków uspokajających sprzyja kolonizacji niefizjologiczną florą bakteryjną, wadom gryzowi i długofalowo wpływa negatywnie na proces karmienia piersią. Uzasadnione jest jedynie podawanie specjalistycznych smoczków w grupie wcześniaków w procesie nauki ssania [15, 19].

## ZASADY PIELĘGNACJI JAMY USTNEJ U DZIECI

Cele pielęgnacji jamy ustnej u dzieci:

- utrzymanie higieny jamy ustnej i nosowej;
- zapobieganie zakażeniom związanym z wentylacją mechaniczną;
- umożliwienie bezpiecznego dojrzewania i rozwoju poprzez minimalizowanie liczby interwencji w obszarze oralnym.

Zagrożenia pojawiające się podczas prowadzenia pielęgnacji jamy ustnej u dzieci:

- niebezpieczeństwo aspiracji treści jamy ustnej do dróg oddechowych;
- uszkodzenie nabłonka jamy ustnej i dziąseł;
- sprowokowanie wymiotów;
- zaburzenie odruchu ssania bądź jego tworzenia się.

Przygotowanie pacjenta:

- poinformowanie o planowanej czynności i sposobie jej przeprowadzenia zarówno dziecko, jak i rodziców/opiekunów;
- ułożenie dziecka w pozycji na plecach z wezgłowiem uniesionym co najmniej o 30° (30–45°), jeśli stan pacjenta na to pozwala, bądź dostosowanie pozycji ułożeniowej w gniazdku wcześniaczym inkubatora. Zaleca się stosowanie bezpiecznej pozycji podczas transportu i diagnostyki. Według zaleceń NHS wezgłowie powinno być uniesione powyżej 30° [2].

Sprzęt niezbędny do prowadzenia pielęgnacji jamy ustnej:

- krótki cewnik stomatologiczny do odsysania śliny, wydzieliny z jamy ustnej i gardłowej;
- zestaw jednorazowy do toalety jamy ustnej, dobrany rozmiarem szczoteczki do wieku pacjenta (typu Q.Care® Oral Cleansing and Suctioning System q4® lub q8®);
- trójścienne szczoteczki do zębów czyszczące jednocześnie wewnętrzną, zewnętrzną i żującą powierzchnię zębów.

Tabela 1. Interwencje dotyczące prewencji VAP.

| Interwencje przeznaczone dla pacjentów dorosłych, nienadające się do adaptacji w grupie dzieci | Interwencje przeznaczone dla pacjentów dorosłych, nadające się do adaptacji w grupie dzieci   | Interwencje redukujące VAP o nieznanym ryzyku: benefit dla noworodków                                 |
|--|---|---|
| Uszczelnianie mankietu rurki inkubacyjnej (IIa)  | Edukacja (Ia)   | Uniesienie wezglowia (II)   |
| Odsysanie podgłośniowe (II)  | Higiena rąk (Ia)  | Higiena jamy ustnej z płynem dezynfekcyjnym (II)  |
| Pokryta srebrem rurka intubacyjna  | Nałożenie rękawic przy kontakcie z wydzieliną (Ib)  | Intubacja przez usta lub nos (Ib)   |
| Profilaktyka zakrzepicy głębokiej  | Minimalizacja czasu wentylacji (Ib)<br>Prewencja powikłań ze strony żołądka (regurgitacja)<br>Prewencja przypadkowej ekstubacji<br>Zmiana trybu wentylacji zgodnie z obserwowanymi objawami<br>Podanie niezainfekowanego sprzętu i osprzętu pacjentowi (Ia)<br>Usunięcie/zmiana trybu wentylacji na spontaniczny – ze zmienną częstością oddechów (Ib)<br>Unikanie reintubacji (II) | Linia zamknięta do odsysania<br>Odstawienie sedacji<br>Zgłębnik żołądkowy założony przez usta lub nos |

W przypadku braku kompletnego zestawu niezbędne są:

- jednorazowe, bawełniane kwaczyki, aplikatory do pędzlowania jamy ustnej, jałowe gaziki, preparat do pielęgnacji ust, np. Bepanthen® maść, sztyft pielęgnacyjny;
- w grupie dzieci powyżej 3. roku życia miękka nylonowa szczoteczka do zębów i pasta dla dzieci z dodatkiem fluoru;
- płyn dezynfekcyjny powinien być dobrany odpowiednio do wieku dziecka:
  - w grupie dzieci powyżej 1. roku życia, np. chlorhexidine gluconate 0,2%, płyn do płukania jamy ustnej Octenidol® (zalecenia NHS),
  - w grupie dzieci powyżej 6. roku życia, np. Oralsept® (zalecenie producenta),
  - w przypadku noworodków pokarm matki,
  - w grupie noworodków o masie ciała <1500 g – siara na śluzówki uzyskana od matki dziecka [2];
- w przypadku zmian chorobowych w jamie ustnej żel o długim okresie przylegania do śluzówki jamy ustnej, stosowany zgodnie z zaleceniami producenta odnośnie grupy wiekowej (np. Plak-Out® Gel, Corosodyl®);
- uzupełniająco spray nawilżający śluzówki jamy ustnej w przypadku jej suchości, np. Aldiamed (płukanika lub żel), Glandosane® spray;
- pomocniczo bloker zgryzu w przypadku występowania szczękocisku czy kłusania.

## ZALECENIA PIELĘGNOWANIA JAMY USTNEJ I NOSOWEJ U DZIECI W ODDZIALE INTENSYWNEJ TERAPII

1. Prowadzenie poprawnej higieny rąk.
2. Stosowanie jednorazowych rękawic ochronnych.
3. Ocena stanu jamy ustnej pacjenta przy pomocy lartarki lub innego źródła światła (Tabela 2).
4. Odessanie z jamy ustnej śliny, krwi oraz treści żołądkowych.
5. Oczyszczenie mechaniczne z nalotu dziąseł oraz języka lub szczoteczka zębów z płytki nazębnej.
6. Nałożenie środka farmakologicznego na miejsce zmienione chorobowo bądź uszkodzone, np. Solcoseryl® Dental Paste.
7. Nałożenie środka pielęgnującego (nawilżającego) na śluzówki i czerwień wargową [18].
8. W grupie dzieci przygotowywanych do zabiegu operacyjnego w znieczuleniu ogólnym należy wykonywać toaletę jamy ustnej jako prewencję powikłań, natomiast w grupie pacjentów zaintubowanych oraz leczonych na oddziale intensywnej terapii konieczne jest przeprowadzanie dokładnej toalety jamy ustnej i nosowej środkami przeznaczonymi do stosowania w odpowiedniej grupie wiekowej.
9. Środkami zalecanymi do stosowania w codziennej toalecie jamy ustnej u pacjentów oddziału intensywnej terapii są preparaty zawierające chlorheksydynę, cetylpirydynę i oktenidynę, wykazujące skuteczność nawet w przypadku braku mechanicznego oczyszczania. W grupie noworodków zaleca się podawanie mleka kobiecego, siary w kroplach bezpośrednio

Tabela 2. Problemy pielęgnacyjne jamy ustnej i propozycje interwencyjne.

| Problemy pielęgnacyjne                                       | Możliwe przyczyny   | Propozycje interwencji pielęgnarskich  |
|--|---|--|
| Spękane usta   | Odwodnienie/niedobór płynów lub produkcji śliny<br>Oddychanie przez usta<br>Twarzowa maska tlenowa<br>Ciągłe odsysanie z jamy ustnej<br>Brak żywienia doustnego   | Standard opieki/higieny oraz dodatkowo:<br>• regularna ocena stanu pacjenta i wdrożenie postępowania;<br>• ocena bilansu płynów;<br>• zwilżanie jamy ustnej wodą/lodem u niezaintubowanych co 2 godziny;<br>• zwilżanie jamy ustnej sterylną wodą na gąbce u zaintubowanych co 2 godziny<br>• smarowanie ust sztyftem pielęgnacyjnym;<br>• dokumentowanie działań  |
| Nalot, odbarwienie śluzówki                                  | Tworzenie płytki nazębnej/uszkodzenia<br>Infekcja Candida   | Standard opieki/higieny oraz dodatkowo:<br>• regularna ocena stanu pacjenta i wdrożenie postępowania;<br>• zwilżanie i oczyszczanie śluzówki (patrz wyżej);<br>• w przypadku braku poprawy – pobranie wymazu z jamy ustnej;<br>• wezwanie lekarza, zgłoszenie problemu pielęgniarce przełożonej;<br>• zakaz stosowania niezleczonych leków/płukanek;<br>• dokumentowanie i śledzenie wyników   |
| Zainfekowana jama ustna i usta lub ich część                 | Herpes simplex<br>Candida<br>Nadżerka   | Standard opieki/higieny oraz dodatkowo:<br>• regularna ocena stanu pacjenta i wdrożenie postępowania;<br>• zwilżanie i oczyszczanie śluzówki (patrz wyżej);<br>• stosowanie miejscowe lub podawanie zaleconego leku (np. przeciwgrzybiczego, przeciwwirusowego);<br>• dokumentowanie i śledzenie wyników   |
| Krwawienie, zaczerwienienie, obrzęk jamy ustnej bądź dziąseł | Zapalenie dziąseł<br>Zabiegi chirurgiczne w obrębie jamy ustnej<br>Niski poziom płytek<br>Wysokie dawki antykoagulantów lub inhibitorów (heparyna, prostacykliny) | Adaptacja standardu opieki/higieny (w przypadku gdy niemożliwe będzie użycie szczotki do zębów):<br>• regularna ocena stanu pacjenta i wdrożenie postępowania;<br>• omówienie i ustalenie z zespołem pielęgnarskim sposobu pielęgnacji;<br>• w przypadku, gdy niemożliwe jest użycie szczotki do zębów, zwilżanie i delikatne czyszczenie aplikatorem z gąbki lub wacikiem/gazikiem na palcu w rękawiczce sterylną wodą;<br>• zakaz stosowania leków i płukanek;<br>• ponowna ocena wyglądu dziąseł, śluzówek i podniebienia;<br>• dokumentowanie i zgłaszanie wszelkich obaw pielęgniarce koordynującej oraz innym członkom zespołu |

na śluzówki jamy ustnej lub sterylnej wody. Palcem w rękawiczce za pomocą gazika należy delikatnie oczyścić dziąsła, zachyłek pod górną i dolną warzą, grzbiet języka, dno jamy ustnej, język; podobnie trzeba postępować u niemowląt poniżej 1. roku życia nieposiadających zębów. W przypadku obecności zębów konieczne jest szczotkowanie ich pastą z fluorem co 12 godzin, delikatne odsysanie wydzieliny, a na koniec przecieranie jamy ustnej sterylną wodą na gąbce bądź szczotce. Co 2–4 godziny należy odświeżać jamę ustną sterylną wodą na gąbce. Podobne działania należy wdrażać w grupie dzieci powyżej 1. roku życia. Po zastosowaniu pasty do zębów trzeba odczekać 30 minut i następnie zaaplikować roztwór 0,2% chlorheksydyny. Nadmiar preparatu (płynu lub

żelu) w jamie ustnej trzeba odessać. Po nałożeniu preparatu dezynfekcyjnego nie można płukać ani zwilżać jamy ustnej wodą [1–3, 20, 21].

- Toaleta jamy ustnej w OIT powinna być wykonywana nie rzadziej niż dwa razy dziennie lub co 6–8 godzin, a nawilżanie śluzówek co 2 godziny. W grupie dzieci zaintubowanych i otrzymujących tlenoterapię bierną czynności pielęgnacyjne powinno wykonywać się częściej [22].
- Toaletę jamy nosowej należy włączyć do rutynowych procedur wykonywanych u pacjentów w stanie ciężkim oraz obowiązkowo przed założeniem zgłębnika żołądkowego przez nos [18, 22].
- Zaleca się pozycjonowanie pacjenta z uniesieniem wezgłowia łóżka pod kątem 30–45°. Pozycja taka



